



## **miraDry Treatment POST CARE**

- Immediately ice the treated area using towel-wrapped ice packs.
- Use non-prescription anti-inflammatory medication (e.g. ibuprofen) to reduce swelling.
- Keep the treated area clean (wash with water and gentle liquid soap).
- Apply an over-the-counter antibiotic ointment (e.g. Neosporin) to prevent infection.
- Avoid shaving or applying antiperspirant / deodorant for the next few days. If deodorant / antiperspirant is still desired after the treatment, discard any partially used product and open a new product.
- Wait few days before resuming exercise and activity.
- Wear loose fitting tops to avoid underarm irritation for the next few days.

**IF YOU EXPERIENCE ANY UNUSUAL REDNESS AND BURNING SENSATION  
PLEASE CALL 17811111**



## علاج miraDry الرعاية اللاحقة

- ضع الثلج فوراً على المنطقة المُعالَجة باستخدام عبوات ثلجية ملفوفة بالمنشفة.
- استخدام الأدوية المضادة للالتهاب التي لا تحتاج لوصفة طبية (مثل ibuprofen) للحد من التورم.
- حافظ على نظافة المنطقة المُعالَجة (اغسلها بالماء وصابون سائل لطيف).
- ضع مرهم مضاد حيوي متاح بدون وصفة طبية (مثل Neosporin) لمنع العدوى.
- تجنب الحلاقة أو وضع مزيل التعرق / مزيل لرائحة العرق للأيام القليلة التالية. في حال الرغبة في استخدام مزيل التعرق / مزيل لرائحة العرق بعد العلاج، لا تستخدم أي منتج سبق استخدامه واستخدم منتجاً جديداً.
- انتظر عدة أيام قبل استئناف ممارسة تمارين أو أنشطة قاسية.
- قم بارتداء قمصان واسعة لتجنّب تهيج تحت الإبط للأيام القليلة التالية.

لحالات الطوارئ أو الاستفسارات لا تتردد في الاتصال بالرقم ١٧٨١١١١١