



TRUSCULT FLEX

POST CARE

- Frequent urination and/or bowel stimulation may be caused by the procedure.
- Tingling/Numbness in the areas treated up to a few hours after procedure.
- Slight muscle soreness/tenderness 24-72 hours after procedure.
- Random muscle contraction after procedure.
- Increase in metabolic rate results in feeling hungry more frequently. Please be aware of this fact and DO NOT overeat.
- Burns beneath the electrodes have been reported with the use of powered muscle stimulators. If this occurs, please call our office for wound management instruction.

**IF YOU EXPERIENCE ANY UNSUAL REDNESS AND BURNING SENSATION
PLEASE CALL 178-111111**



TRUSCULT FLEX

الرعاية اللاحقة

- كثرة التبول و / أو تحفيز الأمعاء قد يكون بسبب الإجراء.
- وخز / تنميل في المناطق المعالجة حتى بضع ساعات بعد العملية.
- وجع / ألم خفيف في العضلات خلال ٢٤-٧٢ ساعة بعد العملية.
- انقباض عضلي عشوائي بعد العملية.
- زيادة معدل الأيض يؤدي إلى الشعور بالجوع بشكل متكرر. يرجى الانتباه لهذه الحقيقة وعدم تناول وجبة دسمة.
- تم الإبلاغ عن حروق تحت الأقطاب الكهربائية باستخدام محفزات العضلات. في حالة حدوث ذلك ، يرجى الاتصال بمكتبنا للحصول على تعليمات إدارة الجروح.

إذا كنت تواجه أي إحساس غير عادي بالإحمرار والحرق يرجى

الاتصال بنا على: ١٧٨١١١١١